

# 3

ÈME

# CONGRÈS FRANCOPHONE DE MÉDECINE GÉNÉRALE OCÉAN INDIEN 25 & 26 AVRIL 2019



*Soignons  
la communication !*

**LUX\* HOTEL**  
SAINT-GILLES-LES-BAINS





**« Intérêt de l'échographie en unité  
de soins de première ligne dans le  
dépistage précoce des  
complications obstétricales »**

**3<sup>ÈME</sup> CONGRÈS FRANCOPHONE DE MÉDECINE GÉNÉRALE OCÉAN INDIEN**



# CONTEXTE

- A Madagascar
  - Fréquence d' utilisation de l' échographe en unité de soins de première ligne par les médecins et les sages-femmes dans leur pratique quotidienne+++
  - Aide dans l' argumentation diagnostic
  - Inexistence des données bibliographiques sur cette pratique

# OBJECTIF

- Rapporter l'usage de l'échographie en unité de soins de première ligne dans le dépistage précoce des complications obstétricales



# METHODES

**3<sup>ÈME</sup> CONGRÈS FRANCOPHONE DE MÉDECINE GÉNÉRALE OCÉAN INDIEN**



# METHODES

- **Type d'étude** : Etude rétrospective des dossiers médicaux et registres d'activité médicale d'un médecin généraliste communautaire échographiste
- **Lieu d'étude** : Sakaraha Madagascar
- **Période d'étude** : entre le 1 janvier 2015 et 31 décembre 2015 ( 1 an)

# METHODES

- **Critère d'inclusion** : tous les dossiers des patientes ayant faits un examen échographique obstétrical pendant cette période
- **Critère d'exclusion** : les dossiers avec des données manquantes



# RESULTATS

**3<sup>ÈME</sup> CONGRÈS FRANCOPHONE DE MÉDECINE GÉNÉRALE OCÉAN INDIEN**





# RESULTATS

- Sur 1224 échographies pratiquées :
  - 327 (26,71%) échographies obstétricales
    - 319 ( 97,5) inclues
    - 8 (2,4%) exclues

# RESULTATS

- Echographie du 1er trimestre :
  - 34 (10,65 %)
    - 7 (20,58) contrôle de l'échec précoce de grossesse
    - 21 (61,76) suivie d'une grossesse normale
    - 4 (11,76) grossesse ectopique
    - 2 (0,06% ) grossesse multiple

# RESULTATS

- Echographie du 2ème trimestre :
  - 67,08% (214) échographie d'organes du foetus
    - 199 cas de grossesse normale
    - 1 cas de méningo-encéphalocèle
    - 1 cas de retard de fermeture de la hernie ombilicale

# RESULTATS

- Echographie du 2ème trimestre :
  - 67,08% (214) échographie d'organes du foetus
    - 1 cas de fente labiale
    - 10 cas de retard de croissance intra utérine
    - 2 cas classés en autres pathologies maternelles

# RESULTATS

- Echographie du 3eme trimestre et ou en salle de travail :
  - 71 (22,25%)
    - 62 cas grossesse normale
    - 2 cas placenta prævia
    - 2 cas hématome rétro-placentaire (HRP)
    - 1 cas de rupture utérine ayant entraîné un geste chirurgical immédiat sur place dans le centre

# RESULTATS

- Echographie du 3eme trimestre et ou en salle de travail :
  - 71 (22,25%)
    - 1 cas la grossesse gémellaire
    - 3 cas la bradycardie inexpliquée et répétée
    - 2 cas de porteur du cordon circulaire
    - 1 cas de toxémie



# CONCLUSION

**3<sup>ÈME</sup> CONGRÈS FRANCOPHONE DE MÉDECINE GÉNÉRALE OCÉAN INDIEN**



# CONCLUSION

- Echographie
  - complément de la clinique comme premier examen complémentaire en unité de soins isolée
  - affinement du diagnostic afin de mieux adapter la stratégie thérapeutique
  - usage : condition essentielle de l'amélioration de la prise en charge des patients en première ligne, à Madagascar comme ailleurs





**Merci de votre aimable attention**

**3<sup>ÈME</sup> CONGRÈS FRANCOPHONE DE MÉDECINE GÉNÉRALE OCÉAN INDIEN**

